



真心關懷  
擁抱健康

成為在地民眾最信賴的健康促進醫院



全人醫療 優質專業 關懷弱勢 深入社區 健康促進 三重院區 板橋院區 成為在地民眾最信賴的健康促進醫院

## 靜脈泌尿道攝影(IVP)

靜脈泌尿道攝影是經由靜脈注射顯影劑，經由泌尿道（包括腎臟、輸尿管與膀胱）排出，再藉由 X 光作腹部前後投射照像，顯示出泌尿系統，常用來檢查先天性異常，包括游離腎、多腎、單腎、多套集尿系統或尿路結石、腫瘤、外傷等問題，此外由顯影的時間也可以看出腎功能的好壞。

### 檢查前注意事項

- ◎ 請攜帶健保 IC 卡及檢查單準時到放射科櫃台報到。
- ◎ 因需注射顯影劑，請詳閱並填妥說明書及簽名，如果經仔細閱讀後您還有任何疑問，請在簽名前提出討論。
- ◎ 安排上午檢查者，前日 24:00 後禁食；安排下午檢查者，當日早餐可吃，至檢查時間前需空腹 4-6 小時。
- ◎ 可穿著沒有金屬及拉鍊的輕便服裝前來檢查，或依工作人員指示換上檢查衣。
- ◎ 若有曾顯影劑過敏、屬過敏體質、洗腎病患請於檢查前主動告知放射師。
- ◎ 若無法按時接受檢查者，請事先通知放射科(聯絡電話：2982-9111#6201)。

### 檢查中注意事項

- ◎ 會請您先上廁所解尿後更換檢查服，進入檢查室後，放射師會請你平躺於檢查台上，先照一張未注射顯影劑腹部 X 光片，請放輕鬆、維持姿勢不動，請你配合吸氣、

continued

閉氣，才能得到清楚的影像。

- ② 注射顯影劑時，有些人時會覺得血管有些微脹、全身發熱的感覺、嘴巴會有藥味是正常的反應，這種感覺約 3-5 分鐘後會自然消失，只要配合作深呼吸調整，如果過程中有任何疼痛或不適可立即向工作人員反應，我們會立即為您處理。
- ② 注射顯影劑後五分鐘、十五分鐘及三十分鐘會各照一張 X 光片，一般泌尿道攝影整個過程約需要 30 分鐘至 40 分鐘左右，會視腎臟排泄情況延長時間或改變攝影擺位加照，如果過程中有任何不適可立即向放射師反應。

#### 檢查後注意事項

- ② 顯影劑是從腎臟代謝隨著尿液排出，只要多補充水分、多解尿即可加速藥物排出(洗腎病患除外)。
- ② 注射顯影劑後，傷口處需加壓約 5~10 分鐘，待無滲血再將膠布移除。

#### 注射顯影劑可能的反應

- ② 1.注射顯影劑者少數人可能會產生各種不同程度反應，如：皮膚癢、起紅疹、噁心、嘔吐、頭暈，但它們通常點時間內就會消退；極少數可能引起較嚴重過敏反應，如蕁麻疹、寒顫、胸悶、呼吸困難、休克。

112.01 10-A5-043



新北市立聯合醫院關心您  
聯絡電話 (02) 2982 9111 分機 6200  
若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡