

電腦斷層(CT)衛教單

電腦斷層掃描是一種結合 X 光照射和電腦影像的診斷工具，它利用不同角度的 X 光穿透人體，經電腦重組成身體切面影像，將人體的組織及器官以切面影像顯示於電視螢幕上，如果組織內有病變，會因與正常組織密度不同而顯現在影像上，是一種無痛且快速的檢查，可以大幅提高疾病的診斷準確性，其檢查過程約需數分鐘到數十分鐘不等，依不同部位檢查時間有所不同。

檢查前注意事項

- ① 請攜帶健保 IC 卡及檢查單準時到放射科櫃台報到。
- ② 如需注射顯影劑，請詳閱並填妥說明書及簽名，如果經仔細閱讀後您還有任何疑問，請在簽名前提出討論。
- ③ 較虛弱病患，檢查當天請務必與家屬或朋友陪同下前來。
- ④ 可穿著沒有金屬及拉鍊的輕便服裝前來檢查，或依放射師指示換上檢查衣，頭部檢查者，請取下髮夾、耳環、眼鏡及活動假牙等金屬製品；女士請先將內衣換下，如果是懷孕期間的婦女請先行告知。
- ⑤ 進入檢查室，會請您平躺於檢查台上，保持姿勢不動，並配合放射師要求；或許會依檢查部位請您吸氣、閉氣，以使影像更為清楚。
- ⑥ 若檢查需注射顯影劑者，於注射時會覺得血管有些微脹、全身發熱的感覺、嘴巴會有藥味是正常的反應，這種感覺

- ◎ 依檢查部位不同所需時間不等，所以檢查前您可以先上個廁所，以免檢查中因膀胱脹而感到不適。
- ◎ 若有曾顯影劑過敏、屬過敏體質、洗腎病患請於檢查前主動告知放射師。
- ◎ 注射顯影劑後若有任何不舒服，請立即告知醫護人員。
- ◎ 若無法按時接受檢查者，請事先通知放射科(聯絡電話：2982-9111#6201)。

檢查後注意事項

- ◎ 顯影劑是從腎臟代謝隨著尿液排出，只要多補充水分、多解尿即可加速藥物排出(洗腎病患除外)。
- ◎ 注射顯影劑後，傷口處需加壓約 5~10 分鐘，待無滲血再將膠布移除。
- ◎ 電腦斷層並不會殘留在體內形成輻射源，故檢查後即可進行一般日常生活。
- ◎ 請您於檢查後自行掛回門診(3-5 天後)，就可看到這次檢查報告。

注射顯影劑可能反應

- ◎ 注射顯影劑者少數人可能會產生各種不同程度反應，如：皮膚癢、起紅疹、噁心、嘔吐、頭暈，但它們通常點時間內就會消退；極少數可能引起較嚴重過敏反應，如蕁麻疹、寒顫、胸悶、呼吸困難、休克。
- ◎ 目前本院使用的是健保局給付的非離子性顯影劑，可大量減少過敏的發生率及嚴重程度。

112.01 10-A5-043



新北市立聯合醫院關心您
聯絡電話 (02) 2982 9111 分機 6200
若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡