



真心關懷
擁抱健康

成為在地民眾最信賴的健康促進醫院



三重 院區 板橋 院區
全人醫療 優質專業 關懷弱勢 深入社區 健康促進 成為在地民眾最信賴的健康促進醫院

包皮環切手術後須知

本手術採局部麻醉或全身麻醉（小孩及無法合作的病人）。如採全身麻醉，手術後幾天內會有喉嚨疼痛的現象，一般會自行復原。

注意事項

- 手術後會用紗布覆蓋傷口，24 小時後可將紗布拿掉，直接抹以抗生素藥膏，不須再包紮，但請穿著寬鬆之褲子。
- 若有包紮，2 天後以清水泡濕包紮之紗布，然後取掉紗布再塗抹抗生素藥膏。以抗生素軟膏塗抹傷口，一天約 2 ~ 3 次。
- 手術後 48 小時，可以溫水清洗傷口，擦乾後敷上藥膏。
- 手術後視情況（為預防傷口疼痛），會給予 3 天口服止痛藥或抗生素。
- 包皮切割傷口約 7 ~ 10 天會癒合，縫合線乃可吸收線，不須拆線，約 2 週會自行吸收掉落。
- 若傷口流血不止及陰莖嚴重腫大，則請儘速至門診或急診複查及處置。

108.06 40-C3-010

新北市立聯合醫院關心您
聯絡電話 (02) 2982 9111 分機 3200
若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡