



喉部顯微手術須知

喉部顯微手術是藉由顯微鏡的裝置，可隨時放大或縮小視野內所見的喉像或所要手術的極小部位。並配合精細的喉顯微器械或雷射精準的切割及蒸發特性，來進行喉顯微手術。

適應症

- 病灶摘除：摘除聲帶息肉、結節或囊腫（喉部囊腫如會厭囊腫）、喉部肉芽腫、或喉乳頭瘤。
- 聲帶整型術：包括聲帶內注射、杓狀軟骨復位、或固定術。

禁忌症

- 病人患有重大疾病如心肺功能失調、凝血障礙等。
- 病人無法或不能頸部伸張，如嚴重駝背、頸椎受傷病人。
- 對於術後聲音有不正當期待者。

手術方式

- 採插管全身麻醉。
- 自口伸入直接喉鏡。
- 充分暴露病灶所在，再架上顯微鏡。
- 以顯微手術器械或雷射進行治療。

併發症

- 嘴唇、牙齦或門牙碰觸傷。
- 軟顎部撕裂傷，一般在 1 星期內會自行痊癒。
- 梨狀竇、咽喉或氣管穿孔；發生率極其罕見。
- 大出血。極少數病人若一再出血不止的話，就可能須自頸部進行動脈結紮。
- 喉痙攣，需緊急氣管插管或甚至氣管切開。

手術後注意事項

- 聲帶手術後需禁聲 5 天，之後 2 週需避免大聲講話、唱歌及說太多話。
- 術後應避免刺激性食物，特別是避免吸菸。
- 從術後可以進食起，應補充適度水份以減少喉部痰液感覺。

108.06 84-C3-010