

置入 Port-A 人工血管的照護

● 什麼是 port-A 人工血管

人工血管注射座俗稱 Port-A-Cath，是一種聚合物(內含強化塑膠、鈦合金、矽質)合成品，包含注射座及連接導管。由外科手術經皮下植入，將導管與靜脈血管相接，除了提供化學治療使用外，也可以作為加藥、輸液、靜脈營養與抽血的途徑，可長期反覆使用，減少周邊血管受刺激而硬化或壞死。通常放置於鎖骨下方胸前處，外觀看起來約十元硬幣大小之突起，但並不會影響一般日常生活、休閒及活動。

● 人工血管照護之注意事項

(一)在使用人工血管給藥時，使用特殊的 L 型針頭(蝴蝶彎針)放置在人工血管基座上，彎針插入處會以防水敷料及紙膠固定，請您儘量穿著前扣式衣物，以方便醫護人員觀察注射部位。

(二)若當您的注射部位有紅、腫、疼痛、有液體滲出(如感覺涼涼的)或異常感覺時，請立即通知醫護人員。

(三)注射藥物期間請小心活動，避免以使用裝置人工血管同側的手臂推行點滴架，減少拉扯點滴管線造成彎針移位。

(四)為了避免人工血管移位應避免手臂請勿做大幅度運動，如 360° 旋轉活動、游泳、打網球、打羽毛球、打高爾夫球、舉重或激烈的擴

胸運動或提重物等，以避免造成基座位置改變，並避免直接碰撞到人工血管。除此之外，一般日常生活不受影響。

(五)注射化學治療藥物期間儘可能臥床休息，若您下床活動後，如上廁所、做檢查，發現點滴有滴速變慢或回血情形，可請護理師檢查您的彎針位置是否正確，是否有移位或變形的情形發生。

(六)睡覺時請勿側向人工血管方向，因為壓力可能會壓迫人工血管造成阻塞。

(七)有極少數的情形下，人工血管基座可能在體內發生移位或翻轉，若您察覺有任何異狀，如皮膚突起位置改變或外觀改變等，應立即通知醫護人員。

(八)定期回門診檢查，若長期輸注時，至少每四週返院，以抗凝血劑常規沖洗人工血管注射座，以避免人工血管阻塞。