



鼻中隔彎曲手術照護須知

兩鼻腔之間的分隔板稱為「鼻中膈」,鼻中膈彎曲就是分隔左右鼻腔的這分隔板彎曲變形了,其真正形成的原因尚不明確。一般除少數鼻中隔彎曲是因為鼻外傷造成外,大部分的彎曲是自然形成的;在頭骨發育的過程中,鼻中隔軟骨的成長速度大於周邊的硬骨,迫使鼻中隔彎曲成長。

何謂慢性肥厚性鼻炎?由鼻孔內看到一塊紅肉,稱為下鼻甲;因下鼻甲肥厚而造成的鼻塞稱為肥厚性鼻炎,大多都因長期鼻子發炎(如過敏性鼻炎、感冒、慢性鼻竇炎等)引起的,治療多以手術為主,採局部或全身麻醉。

症狀

輕微鼻中隔彎曲是人體常見,大部分不會產生影響。但在嚴重彎曲的病人中,可能會導致容易鼻塞、流鼻血,甚至影響鼻實功能而產生鼻竇炎。肥厚性鼻炎則是因為鼻黏膜肥厚、鼻甲肥大而佔據鼻腔空間,容易導致長期鼻塞、呼吸不順。

檢查方式

通常鼻中隔彎曲與慢性肥厚性鼻炎可以藉由病史詢問及身 體檢查來診斷。抽血檢查可以確定是否有過敏體質及對於何種 特定過敏原過敏。

治療

- 嚴重鼻中隔彎曲可以透過(經鼻孔手術),將彎曲的鼻軟骨移除、拉直。手術後鼻部外表不會留下傷口而影響 外觀。容易反覆流鼻血的病人,可另搭配(雷射黏膜燒灼手術),來穩定易流血之粘膜。
- 肥厚性鼻炎可以透過藥物來控制與改善症狀。但在藥物 無法改善的情況下,可以透過(下鼻甲整形手術),來 縮小鼻甲體積而達到改善症狀的效果。

預防

- 先天性鼻中隔彎曲目前無特別的方式可以預防。後天因外力造成之鼻中隔彎曲,則可透過避免外傷、外力衝擊 鼻中隔來達到預防的目的。
- 肥厚性鼻炎則需找到造成慢性發炎的原因來與以預防: 過敏性鼻炎可透過避免過敏原的刺激來預防。血管運動 性的鼻炎,則可透過多加運動以改善體質、和避免溫度 劇烈變化來加以預防。

112.01 84-C3-009



新北市立聯合醫院關心您 聯絡電話 (02) 2982 9111 分機 3200 若有任何疑問·歡迎您與我們聯絡