



脊椎內固定物術後衛教說明

醫療器材名稱：脊椎內固定。

醫療器材說明

脊椎內固定物依據不同的設計分別有不同的功能，包含提供脊椎適當的支撐力，恢復脊椎正常的型態，提供人體椎間盤的支撐。

使用時機

- 椎間盤突出或椎間盤退化合併神經壓迫症狀。
- 椎管狹窄合併神經壓迫。
- 脊椎不穩定合併神經學症狀。
- 脊椎感染合併駝背、脊椎不穩定、或神經壓迫。
- 脊椎骨骨折合併駝背、脊椎不穩定、或神經壓迫。

可能副作用

- 若原本有骨質疏鬆，有可能會有術後脊椎固定物鬆脫的風險。
- 因照護不當或者本身免疫力不佳導致感染。
- 脊椎固定物的強度有其極限，請配合醫師指示作適當的負重，若有不適
- 當的負重或活動有可能會有內固定物斷裂脫位的風險。

術後照護須知

- 術後請配合您的醫師使用適當的拐杖，背架或者輔具；請配合醫師的指示在適當的時間開始負重或者活動肢體。
- 視傷口分泌物情形依據醫師指示予以適當的清潔照護，並於照護後更換乾淨紗布。

- 拆線前請保持傷口乾燥，絕對避免碰到水或者任何非消毒過的物品。
- 出院後請保持傷口乾燥，若有傷口滲濕、或者弄濕傷口請立即消毒換藥。
- 出院前請主要照護者確實了解傷口照護及清潔等步驟，若有任何疑問請向您的醫師或護理師諮詢相關資訊。

112.01 20-A8-035



新北市立聯合醫院關心您
聯絡電話 (02) 2982 9111 分機 3200
若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡