



真心關懷  
擁抱健康

成為在地民眾最信賴的健康促進醫院



全人醫療 優質專業 關懷弱勢 深入社區 健康促進 三重院區 板橋院區 成為在地民眾最信賴的健康促進醫院

## 心導管檢查與檢查前後注意事項

### 檢查目的

- 能確定心臟及血管疾病的嚴重程度、發生位置；使疾病的診斷更精準，使病人得到正確的醫治。
- 可清楚了解疾病對心臟構造功能影響的程度。
- 可在心臟手術前，得到精確、詳細的資料，使手術更成功。
- 更能夠清楚了解冠狀動脈問題。

### 檢查前注意事項

- 填寫同意書。
- 檢查前可能需要抽血檢驗及做心電圖。
- 需要時，會打點滴或放置一個留置針頭，臨時需要時可用。
- 需要時，檢查前會剃除雙側腹股溝（鼠蹊部）的毛髮。
- 聽醫師指示，檢查前有時需要禁食（包含食物及水），至少 4 小時。
- 檢查當天需換穿手術衣（要正穿）。
- 檢查前不宜化妝、不必穿內衣褲，身上若有假牙、隱形眼鏡、義肢、金錢、飾物則須暫時取下。此外請勿擦口紅及指甲油，以便評估血液循環狀況。
- 由於檢查中不能移動身體，故請您在至心導管室檢查前，先排空膀胱。
- 護理人員會為您準備看護墊，墊在您臀部下方，當檢查中感到尿漲，您即可安心解尿。

continued

- 於少數情況下，若您於手術平躺過程中感到解尿困難，醫師可能會為您導尿。

#### 檢查過程

- 護理人員會協助您移至檢查台上，請您依指示擺放好適當的位置平躺，不宜自行翻身或移動，以避免摔傷等無預期風險。
- 醫師會先在您的腹股溝或手臂手腕作皮膚消毒，若您感到皮膚灼熱或刺痛，請告訴醫護人員，切勿伸手觸摸，以避免感染等風險。

#### 檢查後注意事項

##### 由股動靜脈（鼠蹊）接受檢查者：

- 插入導管作為檢查的部位一定要伸直、勿彎曲，身體其它部位則可以自由活動。導管完全移除後需用 2 公斤砂袋加壓止血 6 ~ 8 小時、平躺 12 小時，目的為使內部血管能完全癒合，防止出血及血腫產生。於臥床期間，請勿下床。
- 密集的監測生命微象：包括血壓、脈搏、及檢查部位的皮膚溫度、足背動脈搏動是否對稱或消失。需注意局部是否有腫脹、疼痛、出血等。
- 可利用床上便盆或包尿布如廁；如果無法解出來，可由醫護人員協助導尿。

##### 由橈骨動脈（手）接受檢查者：

- 插入導管作為檢查的部位，會以 2 層布膠加壓止血。
- 經過短暫的臥床休息後，沒有不舒服情形，即可下床活動。

continued

- 密集的監測生命徵象：包括血壓、脈搏、及檢查部位有無出血、皮膚溫度、顏色變化。
- 檢查後，插入導管檢查的手腕，在 3 天內請勿用力、勿提重物、勿內彎或作扭毛巾動作，以防止內部血管再度出血而腫脹。
- 穿刺傷口需保持清潔乾燥，勿直接以水淋濕，直至傷口癒合，以預防感染。

#### 請您留意下列事項

- 檢查後就可以吃東西，並且要多喝水，以幫助顯影劑排出，但水份限制者除外。
- 您在做完心導管檢查後，如果有出現下列情形，請立即告知醫護人員：胸口悶、胸口痛、呼吸不順、及檢查部位的傷口有濕熱感、出血、疼痛、末梢皮膚冰冷、刺麻等。

#### 可能產生的合併症

- 診斷性心導管發生死亡併發症的機率小於 0.001，若是冠狀動脈氣球擴張術則死亡率則小於 0.01。
- 合併症與病人病情嚴重度有關，包括有：藥物過敏、局部傷口出血及血腫、心律不整、低血壓、心絞痛、休克、急性腎衰竭、急性肺水腫、冠狀動脈剝離、血管痙攣、急性心肌梗塞、血管或心臟破裂、中風及死亡。

112.01 10-C6-082



新北市立聯合醫院關心您  
聯絡電話 (02) 2982 9111 分機 3200  
若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡