

Aleviatin

- 學名：**Phenytoin**
商品名：**Aleviatin 100mg Tab.**
中文名：阿雷彼阿慶片
適應症：癲癇症
服用方法：請遵照醫師處方服藥
注意事項：
①本品為強鹼性，口服對胃壁有刺激性，故應飯後服用，且多飲水。
②懷孕婦女請勿服用，若需服用則應避免於懷孕前三個月服用。
③定期做牙齦按摩，宜經常刷牙，以減少牙齦增生。
④不可突然改變劑量或停藥，可能會造成驚厥。
⑤本品會干擾葉酸吸收，因此服用期間若有貧血或神經病變，應告知醫師。
⑥服藥後，不可喝酒精性飲料且不宜從事危險性工作（如開車、游泳）。
⑦本品會降低避孕藥的效果，宜採其他方式避孕。

可能的副作用：運動不能、眼球震顫、心智混亂、語無倫次、嘔吐、噁心、眩暈、失眠、倦怠、神經質、牙齦紅腫、皮膚出現小紫斑。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，有任何問題時請電：

板橋院區2257-5151轉2138

三重院區2982-9111轉3189

修訂日期：105年1月15日

Aleviatin

- 學名：**Phenytoin**
商品名：**Aleviatin 100mg Tab.**
中文名：阿雷彼阿慶片
適應症：癲癇症
服用方法：請遵照醫師處方服藥
注意事項：
①本品為強鹼性，口服對胃壁有刺激性，故應飯後服用，且多飲水。
②懷孕婦女請勿服用，若需服用則應避免於懷孕前三個月服用。
③定期做牙齦按摩，宜經常刷牙，以減少牙齦增生。
④不可突然改變劑量或停藥，可能會造成驚厥。
⑤本品會干擾葉酸吸收，因此服用期間若有貧血或神經病變，應告知醫師。
⑥服藥後，不可喝酒精性飲料且不宜從事危險性工作（如開車、游泳）。
⑦本品會降低避孕藥的效果，宜採其他方式避孕。

可能的副作用：運動不能、眼球震顫、心智混亂、語無倫次、嘔吐、噁心、眩暈、失眠、倦怠、神經質、牙齦紅腫、皮膚出現小紫斑。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，有任何問題時請電：

板橋院區2257-5151轉2138

三重院區2982-9111轉3189

修訂日期：105年1月15日