

Bloodfull

學名：**Ferrous、Folic acid、Cyanocobalamin、Thiamine、Riboflavin、Nicotinamide**

商品名：**Bloodfull S.C. Tab.**

中文名：益血康糖衣錠

適應症：妊娠期、發育期、貧血、手術後及其他一般鐵質缺乏性貧血、低血色素貧血。

服用方法：請遵照醫師處方服藥

注意事項：①服用鐵劑後不可喝茶、咖啡、可樂等含咖啡因飲料。

②不可與制酸劑之胃藥及四環類抗生素合用，以免妨礙吸收。

③服藥期間多吃高纖維食物，以防便秘。

忘記服藥時：請立即補服一次量，但如果與下次服藥時間相近，則按時服下次劑量，但不可服用兩倍量。

可能的副作用：胃部不適、便秘、黑便。

藥品保存方法：請置於室溫、避光乾燥處，且應置於孩童拿不到的位置。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，有任何問題時請電：

板橋院區2257-5151轉2138

三重院區2982-9111轉3189

修訂日期：105年1月15日

Bloodfull

學名：**Ferrous、Folic acid、Cyanocobalamin、Thiamine、Riboflavin、Nicotinamide**

商品名：**Bloodfull S.C. Tab.**

中文名：益血康糖衣錠

適應症：妊娠期、發育期、貧血、手術後及其他一般鐵質缺乏性貧血、低血色素貧血。

服用方法：請遵照醫師處方服藥

注意事項：①服用鐵劑後不可喝茶、咖啡、可樂等含咖啡因飲料。

②不可與制酸劑之胃藥及四環類抗生素合用，以免妨礙吸收。

③服藥期間多吃高纖維食物，以防便秘。

忘記服藥時：請立即補服一次量，但如果與下次服藥時間相近，則按時服下次劑量，但不可服用兩倍量。

可能的副作用：胃部不適、便秘、黑便。

藥品保存方法：請置於室溫、避光乾燥處，且應置於孩童拿不到的位置。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，有任何問題時請電：

板橋院區2257-5151轉2138

三重院區2982-9111轉3189

修訂日期：105年1月15日