

## Lamisil

學名：**Terbinafin**

商品名：**Lamisil 250mg Tab.**

中文名：療黴舒錠

適應症：治體癬、股癬、足癬、髮癬、灰指甲等黴菌感染。

服用方法：請遵照醫師處方服藥

注意事項：①2歲以下小孩不建議使用。

②懷孕婦女不建議使用。

③服用後若持續的噁心、食慾不振、疲倦而肝功能異常時，須作肝功能檢查。

忘記服藥時：請立即補服一次量，但如果與下次服藥時間相近，則按時服下次劑量，但不可服用兩倍量。

可能的副作用：腸胃不適 ( 包括噁心、消化不良、飽脹、腹瀉 )、紅疹、蕁麻疹、關節痛、肌痛。



**新北市立聯合醫院 藥劑科謹製**

本單無法詳載所有藥物資訊，有任何問題時請電：

板橋院區2257-5151轉2138

三重院區2982-9111轉3189

修訂日期：105年1月15日

## Lamisil

學名：**Terbinafin**

商品名：**Lamisil 250mg Tab.**

中文名：療黴舒錠

適應症：治體癬、股癬、足癬、髮癬、灰指甲等黴菌感染。

服用方法：請遵照醫師處方服藥

注意事項：①2歲以下小孩不建議使用。

②懷孕婦女不建議使用。

③服用後若持續的噁心、食慾不振、疲倦而肝功能異常時，須作肝功能檢查。

忘記服藥時：請立即補服一次量，但如果與下次服藥時間相近，則按時服下次劑量，但不可服用兩倍量。

可能的副作用：腸胃不適 ( 包括噁心、消化不良、飽脹、腹瀉 )、紅疹、蕁麻疹、關節痛、肌痛。



**新北市立聯合醫院 藥劑科謹製**

本單無法詳載所有藥物資訊，有任何問題時請電：

板橋院區2257-5151轉2138

三重院區2982-9111轉3189

修訂日期：105年1月15日