

病患用藥指導卡 紅7

Coxine Sordur

學名：**Isosorbide-5-mononitrate**

商品名：**Coxine 20mg Tab.**
Sordur CR. 60mg Tab.

中文名：冠欣錠
圓心持續性藥效錠

適應症：預防狹心症之發作

服用方法：請遵照醫師處方服藥

注意事項：①嚴重貧血、顯著的低血壓、顱內壓增加、腦溢血及心肌梗塞之急性期患者禁用。
②剛開始使用本藥品時，應避免駕駛或操作機械。
③突然停藥可能會引起胸痛，請勿擅自停藥。

忘記服藥時：請立即補服一次量，但如果與下次服藥時間相近，則按時服下次劑量，但不可服用兩倍量。

可能的副作用：頭痛、姿態性低血壓、心搏過速、潮紅、過敏、眩暈、噁心、嘔吐。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，有任何問題時請電：

板橋院區2257-5151轉2138

三重院區2982-9111轉3189

修訂日期：105年1月15日

病患用藥指導卡 紅7

Coxine Sordur

學名：**Isosorbide-5-mononitrate**

商品名：**Coxine 20mg Tab.**
Sordur CR. 60mg Tab.

中文名：冠欣錠
圓心持續性藥效錠

適應症：預防狹心症之發作

服用方法：請遵照醫師處方服藥

注意事項：①嚴重貧血、顯著的低血壓、顱內壓增加、腦溢血及心肌梗塞之急性期患者禁用。
②剛開始使用本藥品時，應避免駕駛或操作機械。
③突然停藥可能會引起胸痛，請勿擅自停藥。

忘記服藥時：請立即補服一次量，但如果與下次服藥時間相近，則按時服下次劑量，但不可服用兩倍量。

可能的副作用：頭痛、姿態性低血壓、心搏過速、潮紅、過敏、眩暈、噁心、嘔吐。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，有任何問題時請電：

板橋院區2257-5151轉2138

三重院區2982-9111轉3189

修訂日期：105年1月15日