

病人用藥指導卡

鼻用噴劑

商品名：Pulmicort 能舒鼻鼻腔定量噴液劑
Flixonase 輔舒良鼻用噴液懸浮劑

一、使用步驟



步驟一

搖勻鼻噴劑，直立取下防塵蓋。



步驟二

垂直拿著鼻噴劑，並把噴嘴向外。將食指與中指置於噴嘴頸上方的兩側，拇指則置於瓶底下。拇指保持不動，食指與中指壓下噴嘴頸已釋放細微的噴霧至空中，**首次使用請壓數次直到出現薄霧(如左圖)**，此時鼻噴劑已可供使用。



步驟三

先擤鼻以清潔鼻孔。再用手指壓住其中一個鼻孔，並將噴嘴小心地放進另一邊鼻孔。用鼻吸氣的同時請按壓噴嘴頸。用口呼氣，再換另一邊鼻孔用藥。


步驟四

使用完畢請用乾淨的紙巾或手帕擦拭噴嘴，並將防塵蓋蓋回鼻噴劑。

二、注意事項

1. 請至少每周清潔一次鼻噴劑，以免噴嘴堵塞。請依下列步驟清潔：

- (1) 取下防塵蓋
- (2) 向上拔出以取下噴嘴(如右圖)
- (3) 將噴嘴與防塵蓋至於溫水中數分鐘
- (4) 然後於水龍頭下清洗
- (5) 甩掉多餘水份並風乾
- (6) 將噴嘴放回鼻噴劑上，下次使用前須先對空噴一次之後才可使用。



2. 請依醫師指示之劑量使用，勿自行調整劑量。
3. 若非每日使用，使用前請先壓 1 次。

三、儲存方式

藥品應置於兒童不易拿取的地方，將藥品儲存於室溫，遠離高溫、高濕度(不要放在浴室)並避免陽光直射。過期或不再需要的藥品應丟棄。



新 北 市 立 聯 合 醫 院
藥 劑 科 謹 製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：
三重院區(02)2982-9111 分機 3189
板橋院區(02)2257-5151 分機 2138