

病人用藥指導卡

鼻用噴劑

商品名：Avamys 艾敏釋鼻用噴液懸浮劑

一、艾敏釋鼻用噴液懸浮劑的組成




二、初次使用準備步驟



步驟一

用力搖勻鼻噴劑約十秒鐘。因為艾敏釋非常黏稠，只有用力搖勻才會液化。



步驟二

取下防塵蓋。



步驟三


垂直拿著鼻噴劑，並把噴嘴向外。按壓按鈕並重覆至少 6 次直到空中出現一團微細的噴霧。

三、使用步驟



步驟一

用力搖勻鼻噴劑。



步驟二

取下防塵蓋。



步驟三

擤清鼻孔，頭稍微向前傾。垂直拿著鼻噴劑，將噴嘴小心地放進鼻孔。將噴嘴末端稍微向外，離開鼻中隔。這有助於藥物達到鼻孔內正確部位。



步驟四

用鼻吸氣時，按壓一次按鈕。移出噴嘴，並用口呼氣。換另一邊鼻孔用藥。

步驟五

使用完畢請用乾淨的紙巾或手帕擦拭噴嘴，並將防塵蓋蓋回鼻噴劑。

四、注意事項

1. 艾敏釋鼻噴劑可提供 120 次的噴霧劑量。使用 120 次後，瓶子可能不會完全是空的，但無法確保每次噴霧中的正確含藥量，請勿再使用。
2. 本藥品僅能用於鼻內，勿噴入眼睛或嘴巴。
3. 近期有鼻潰瘍、鼻外傷或鼻手術的病人在傷口癒合前不應使用艾敏釋鼻噴劑。

五、儲存方式

藥品應置於兒童不易拿取的地方，並儲存於 30°C 以下，遠離高溫、高濕度(不要放在浴室)並避免陽光直射。過期或不再需要的藥品應丟棄。



新 北 市 立 聯 合 醫 院
藥 劑 科 謹 製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：
三重院區(02)2982-9111 分機 3189
板橋院區(02)2257-5151 分機 2138