

病人用藥指導卡

Accuhaler

商品名：Seretide 250 accuhaler 使肺泰乾粉吸入劑

一、使用步驟



步驟一

用一隻手拿住吸入劑，讓劑量視窗面對自己，把另一隻手的大拇指放在拇指把手上，向後推至盡頭卡住。



步驟二

這時你會看到上藥板手，用大拇指將上藥板手向後扳到底，你會聽到「喀」一聲，此時即有一次劑量可供使用。



步驟三

先吐一口氣，然後將吸入劑吸嘴緊緊含於兩唇之間，同時盡可能**用力且快速的深吸一口氣**。吸入後將吸入劑從嘴唇移開，**閉氣 5-10 秒**，然後恢復正常呼吸。



步驟四

用乾布或衛生紙擦拭吸嘴，不要用水直接沖洗吸嘴，並關閉吸入劑。使用完藥物後**務必漱口**。若您需要使用第二個劑量，請於 1 分鐘後重複步驟二、三。

二、餘量顯示



新開封藥品每瓶含有 60 個劑量，劑量視窗的數字會隨著每次使用而遞減，當劑量窗口出現紅色時，表示約剩 5 次劑量可用。

三、注意事項

1. 請依醫師指示之劑量使用，勿自行調整劑量。
2. 使肺泰乾粉吸入劑無法緩解氣喘之急性發作，請勿於急性發作時使用。



新 北 市 立 聯 合 醫 院
藥 劑 科 謹 製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：
三重院區(02)2982-9111 分機 3189
板橋院區(02)2257-5151 分機 2138