

病人用藥指導單張 Permethrin

成分：Permethrin [濃度 50mg/g, 一條藥膏 30g]

商品名：Permethrin 5% cream 乳膏

一、 作用

用於治療疥瘡，疥瘡是人類皮膚感染疥蟲，會在表皮的顆粒層穴居產卵，疥蟲會引起人類的過敏反應，典型疥瘡臨床症狀為極度搔癢、紅斑、丘疹、水泡[如右圖]，甚至會併發細菌感染的風險。相較於其他外用藥物，本藥的治癒率高副作用低。



二、 使用步驟



1 指甲下緣可能會藏有疥蟲



4 注意不要漏掉
指甲內緣、指縫、耳後、腋下、肚臍、生殖器



2 洗淨皮膚後全身擦乾



5 建議睡前抹藥



3 待體溫下降再開始抹藥，避免因體溫高增加藥物全身性吸收



6 待 8-14 小時後才能將藥物洗掉



7 若有需要，醫師會開立兩條藥膏，第二條於一周後再使用一次



8 兩次療程結束後請回診追蹤檢查

[圖片來源：Po-Ju Lai MD blog]

三、 注意事項

1. 擦藥期間除了衣物以外，盡量避免碰觸其他物體，也禁止洗手，避免藥物被洗掉，戴手套是比較好的保護方式。
2. 若是小孩、老人或是免疫力不全的病人，可能會需要塗抹頸部以上的部位，但請務必避開眼睛和嘴巴周圍，用量請依醫師指示抹藥。

四、 副作用：過敏、接觸性皮膚炎

五、 藥品儲存方式：室溫保存

六、 環境處理

1. 只要有接觸到患者皮膚的人均有可能被傳染。
2. 患者的衣物、床被單、毛巾均必須用 50°C 以上的水煮或烘乾機烘(熱烘)至少 10 分鐘，若無法加熱處理，就用塑膠袋密封置於室溫至少 72 小時或是直接丟棄。
3. 患者接觸過的家具建議用吸塵器清潔，或是用含有除蟲菊化合物的水煙式殺蟲劑進行除蟲。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138