

病人用藥指導單張 麗露 Ladiol

成分：17- β Estradiol [濃度 0.6mg/g, 一條藥膏 30g]

商品名：Ladiol gel 麗露凝膠

- 一、作用：因停經引起之血管異常、因卵巢分泌障礙所致之萎縮、女性生殖功能不足、卵巢切除者、原發性卵巢功能障礙。
- 二、用法：一般用法為每月之第 1 至 24 日，每日一次同一時間以 2.5gm(記量尺之凹槽的量)之凝膠塗抹於皮膚，**最佳塗抹部位為腹部和大腿內側**，手臂、肩膀亦可，避免塗抹於乳房、陰道、毛髮、傷口和黏膜。
- 三、使用步驟：
 1. 依據個人作息，建議在休息時間使用
 2. 沐浴後，身體擦乾
 3. 壓擠藥膏於藥盒內附之記量尺內，如下圖



4. 直接用記量尺將凹槽內的藥膏塗抹於皮膚
 5. 待藥品吸收後再穿衣，避免沾附於衣物
 6. 洗淨雙手
- 四、注意事項：抹藥部位若有過敏紅疹的情況請回診告知醫師，**使用完一定要洗淨雙手，避免造成他人間接觸碰到藥物。**

修訂日期：107 年 6 月 25 日

五、儲存方式：室溫儲存

六、使用記錄

以下表格方便您作記錄使用，有用藥的“日期”請打勾

_____ 月				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

_____ 月				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138