

## 病人用藥指導卡

# Clobex

學名：Clobetasol propionate 500 mcg/g

商品名：Clobex shampoo 60ml 柔倍絲藥用頭皮洗劑

### 一、作用

局部性治療成人之中度頭皮乾癬。

### 二、使用步驟

每日一次，施用於乾頭皮上，請遵照醫師指示使用。



1. 頭髮未淋溼前，從頭皮撥開毛髮，將小量(約 7.5 毫升)頭皮洗劑直接塗抹於患處部位後推開，讓整個患部覆蓋均勻薄膜，可適度按摩以幫助頭皮吸收。



2. 讓頭皮洗劑停留患部 15 分鐘，切勿在其上覆蓋東西。



3. 加水搓揉起泡，請小心避開眼睛、嘴唇及臉部。



4. 將整個頭皮和身體接觸到頭皮洗劑部分徹底沖洗乾淨，必要時可另外再用一般洗髮精洗淨。

### 三、注意事項

1. 不可用於臉部、鼠蹊部或腋窩，盡量減少接觸到身體非患部皮膚區域。
2. 除非醫師指示，請勿用外物或浴帽覆蓋、密封塗藥的部位。
3. 治療以 **4 周** 為限，於病情獲得控制時，可減少使用次數。
4. **每周總劑量不可超過 50 毫升。**
5. 此藥不推薦 18 歲以下病人使用，並嚴禁 2 歲以下兒童使用。
6. 若您將要進行手術，請記得告訴醫師或牙醫師您正在使用 Clobex 頭皮洗劑。
7. 若您目前已懷孕 / 計劃準備懷孕，或正在哺乳，請務必告訴您的醫師。

### 四、副作用

常見副作用有皮膚刺痛、搔癢、灼熱感或發紅，其他可能的副作用包括皮膚變薄、表皮微血管擴張等。

### 五、儲存方式

藥品應置於兒童不易拿取的地方，將藥品儲存於室溫，遠離高溫、高濕度(不要放在浴室)並避免陽光直射。過期或不再需要的藥品應回收。



新 北 市 立 聯 合 醫 院  
藥 劑 科 謹 製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：  
三重院區(02)2982-9111 分機 3189  
板橋院區(02)2257-5151 分機 2138