

病人用藥指導卡

Aldara

學名：Imiquimod


商品名：Aldara 5% 250 mg/pk 樂得美乳膏

一、作用

樂得美乳膏可治療成人生殖器外部及肛門周圍的疣和尖形濕疣，此藥也可能用於治療其他病症。

二、使用步驟

請遵照醫師指示使用，一般建議每週使用三次。



1. 臨睡前，請將雙手洗淨，然後拆開包裝，將「樂得美」乳膏擠於手指頭上。

2. 將乳膏薄塗於潔淨而乾爽的疣表面，輕輕按摩直到乳膏完全滲透。

3. 完成後，請把剩餘的乳膏連包裝一併丟棄，勿讓兒童接觸。請以性質溫和的肥皂和水清洗雙手。

4. 睡前使用，塗抹乳膏後 6-10 小時內，請勿洗澡。

5. 起床後或 6-10 小時後，應以性質溫和的肥皂和清水潔淨患處。

三、注意事項

1. 使用此藥時：

- (1) 除非醫師指示，否則請不要將塗藥的患部緊密包覆。
- (2) 為避免加重原有的皮膚發炎反應，因此，除特殊情況外，生殖器官有皮膚炎或外科術後患部組織未痊癒前不建議使用本藥品。
- (3) 為避免減弱保險套和陰道避孕隔膜的功能，因此不建議併用本藥品，從事任何性接觸前(生殖器官、肛門、口)需先將皮膚上的乳膏洗淨。
- (4) 除非醫師建議，否則勿與其他外用藥併用於同一部位。
- (5) 若塗抹後有嚴重的皮膚反應發生，可用肥皂與清水洗淨並儘速告知醫師。

四、副作用

塗藥患部可能會有輕至中度的灼熱感、皮膚褪色、刺痛、癢、紅疹或紅斑等反應，但若出現嚴重的皮膚反應(如紅腫、潰瘍)，請儘速告知醫師。

五、儲存方式

藥品應置於兒童不易拿取的地方，將藥品儲存於室溫，遠離高溫、高濕度(不要放在浴室)並避免陽光直射。過期或不再需要的藥品應丟棄。



新 北 市 立 聯 合 醫 院
藥 劑 科 謹 製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：
三重院區(02)2982-9111 分機 3189
板橋院區(02)2257-5151 分機 2138