

病人用藥指導卡

Durogesic D-Trans 25ug/h(Fentanyl 貼片)

學 名：Fentanyl 25ug/hr

商品名：Durogesic D-Trans 25ug/h

一、作用

需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。

二、使用步驟

1. 於上軀幹或上臂找一塊無刺激及放射線照射的平整皮膚表面，兒童以上背部為較理想的部位。
2. 使用貼片前要將貼藥部位的毛髮剪除，清潔投與部位的皮膚時，用清水清潔即可，不能使用肥皂、油、乳液、或任一其它會刺激皮膚的物質。
3. 貼上貼片之前應使部位完全乾燥。
4. 從密封包裝取出貼片時要立刻將其貼上，將保護層自貼片移除後，把貼片貼上皮膚並用手掌用力緊壓 30 秒，確保整片貼片完全與皮膚接觸，尤其是角落部位應緊密黏貼。
5. 手部應避免碰觸貼片黏著層，若接觸到應以清水洗手。

三、注意事項

1. 用過貼片的處理：
 - (1.) 使用過的貼片，應對黏後放入原包裝紙袋，繳回醫院藥局銷毀。
 - (2.) 如有未曾使用剩下之貼片應退還醫院藥局。
 - (3.) 貼上貼片後或移除貼片後只能用水洗手。
2. 貼片不能分割、切開或以任何方式破壞，因為這可能會破壞貼片的緩釋劑型。

3. 每片貼片能提供全身 72 小時 Fentanyl 的全身釋放(每片可使用 3 天)。
4. 新的貼片要貼在與前一片不同的位置，同一部位的皮膚必須相隔數日才可再貼上一片新貼片。
5. 身體貼有貼片的部位應避免直接照射陽光、接觸電毯或熱敷，以免因高溫而增加皮膚對藥品的吸收。
6. 此貼片可能會降低須執行較低危險性工作性質的人(如: 駕車、機械操作)之精神或生理能力。
7. 避免喝酒精性飲料，酒精會加強此藥品的鎮靜作用。
8. 使用貼片期間請避免食用葡萄柚或葡萄柚汁，以避免增強此藥品的副作用。

四、副作用

本品與靜脈注射類鴉片有相同的副作用如呼吸抑制、窒息、肌肉僵硬(包括胸部肌肉)、肌陣攣運動、心跳過慢、(短暫性)低血壓噁心嘔吐和暈眩。

五、儲存方式

藥品應置於兒童不易拿取的地方，將藥品儲存於 30°C 以下，遠離高溫、高濕度(不要放在浴室)並避免陽光直射。



新 北 市 立 聯 合 醫 院
藥 劑 科 謹 製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：
三重院區(02)2982-9111 分機 3189
板橋院區(02)2257-5151 分機 2138