

藥物管灌注意事項

一般藥物管灌步驟：

1. 將磨好粉的藥物或是取出膠囊中的內容物，加入 10-30ml 水攪拌溶解
2. 給藥前先用 30ml 的水沖洗管壁
3. 將藥物倒入注射空針內進行管灌
4. 給完所有藥後再用 30ml 水沖洗管壁，避免餵食管阻塞

注意事項：

1. 藥物及管灌營養配方之間常常會互相影響，所以避免把藥物倒入灌食溶液或營養配方中，建議在管灌藥物前後 2 小時內避免管灌營養配方。
2. 經確認可以磨粉的藥物，不要先行磨粉，在給藥前再磨成粉，以維持藥品安定性。
3. 不是所有藥物都適合管灌，有些藥品在研磨之後可能無法達到原有的療效，有些可能會造成刺激性，而影響病患的健康；若醫師有調整藥物品項，請詢問藥師調整後的藥物品項是否可以用於管灌。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有資訊，有任何問題時請電：

三重院區 2982-9111轉3189

板橋院區 2257-5151轉2138

製作日期：106 年 1 月 19 日

藥物管灌注意事項

一般藥物管灌步驟：

1. 將磨好粉的藥物或是取出膠囊中的內容物，加入 10-30ml 水攪拌溶解
2. 給藥前先用 30ml 的水沖洗管壁
3. 將藥物倒入注射空針內進行管灌
4. 給完所有藥後再用 30ml 水沖洗管壁，避免餵食管阻塞

注意事項：

1. 藥物及管灌營養配方之間常常會互相影響，所以避免把藥物倒入灌食溶液或營養配方中，建議在管灌藥物前後 2 小時內避免管灌營養配方。
2. 經確認可以磨粉的藥物，不要先行磨粉，在給藥前再磨成粉，以維持藥品安定性。
3. 不是所有藥物都適合管灌，有些藥品在研磨之後可能無法達到原有的療效，有些可能會造成刺激性，而影響病患的健康；若醫師有調整藥物品項，請詢問藥師調整後的藥物品項是否可以用於管灌。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有資訊，有任何問題時請電：

三重院區 2982-9111轉3189

板橋院區 2257-5151轉2138

製作日期：106 年 1 月 19 日