

## 用藥指導單張 紫 8

中文品名：溫不妊 28 膜衣錠	英文品名：Winstop 28
成分名：Ethinyl Estradiol/Levonorgestrel	含量：0.05 mg/0.25 mg

1. 適應症：口服避孕藥

2. 服用方式：口服。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。

一般服用方式：藥品有 21 顆橘色錠 (含活性成分)，7 顆白色錠 (不含活性成分)。經期第一天或第五天開始服用第一顆橘色錠，每天相同時間服用一顆持續服用，橘色錠服用完畢後服用白色錠，直至整盒 28 顆服用完畢後，接著服用新的一盒，不可中斷。

建議可睡前或與食物併服可減少噁心嘔吐感。

3. 可能發生的副作用：頭暈、頭痛、體重改變、乳房變化、背痛。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	肝臟、膽囊功能異常警訊：深色尿、疲倦、無食慾、胃部不適、淺色糞便、嘔吐、皮膚眼睛發黃、右上腹部或右肩區域疼痛、發燒寒顫
3	高血壓症狀：異常頭痛、頭暈、昏倒或視力改變
4	身體單側無力，說話或思考困難，平衡失調，面部一側下垂或視力模糊
5	持續性的抑鬱或其他情緒變化
6	乳房腫塊、乳房疼痛或乳頭分泌液體
7	陰道搔癢、子宮陰道分泌物之增加
8	子宮不正常出血、破綻出血、點狀出血
9	視力改變、眼睛腫脹
10	水腫、體重增加、腿部或手臂腫脹、呼吸短促、呼吸或說話和吞嚥困難
11	血栓症狀如胸痛或緊縮感、手臂或腿部不明原因間斷性或持續性疼痛

請續閱背面

#### 4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及種草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 橘色錠服用完畢後，開始服用白色錠的第一天至第七天月經來潮，請按照原本服用方式持續服藥，請勿停藥。

(3) 若非月經來潮期間有陰道出血的情形，請持續觀察出血量，不需停藥，若有出血量持續增加，或超過一周未停止者，則建議回診。

(4) 第一次服用避孕藥或忘記服用避孕藥(二天內)後的七天內，為達避孕之目的，建議使用額外的避孕措施(保險套)。

(5) 忘記服藥處置方式：

當天或 12 小時內想起盡快補服一錠，隔天按照原本時間服用一錠。

第二天想起或超過 12 小時則該日必須服用兩錠，隔天按照原本時間服用一錠。

第三天或以上才想起則須將漏服的藥錠丟棄，持續服用接下來應服用的藥錠，接下來需使用保險套直至該包藥品全數服用完畢為止。

(6) 長期服用者每隔六個月應做例行的婦科檢查。

(7) 停止服用本藥後，三個月內月經仍未恢復正常應回診就醫。

(8) 服用此藥若抽煙會增加心血管疾病之風險，若您的年齡超過 35 歲且吸菸，建議請勿服用此藥。

#### 4. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138