

用藥指導單張 紫 9

女性荷爾蒙補充劑

中文品名	英文品名	成分名	含量
康樂娜	Covina	Estradiol / Norethisterone acetate	2 毫克/ 1 毫克
維妮娜	Venina	Estradiol valerate/ Medroxyprogesterone acetate	1 毫克/ 2.5 毫克

1. 適應症：雌性激素缺乏症
2. 服用方式：口服，請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：頭暈、頭痛、體重改變、乳房變化、背痛。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	肝臟、膽囊功能異常警訊：深色尿、疲倦、無食慾、胃部不適、淺色糞便、嘔吐、皮膚眼睛發黃、右上腹部或右肩區域疼痛、發燒寒顫
3	高血壓症狀：異常頭痛、頭暈、昏倒或視力改變
4	身體單側無力，說話或思考困難，平衡失調，面部一側下垂或視力模糊
5	持續性的抑鬱或其他情緒變化
6	乳房腫塊、乳房疼痛或乳頭分泌液體
7	陰道搔癢、子宮陰道分泌物之增加
8	子宮不正常出血、破綻出血、點狀出血
9	視力改變、眼睛腫脹
10	水腫、體重增加、腿部或手臂腫脹、呼吸短促、呼吸或說話和吞嚥困難
11	血栓症狀如胸痛或緊縮感、手臂或腿部不明原因間斷性或持續性疼痛

請續閱背面

4. 注意事項：

- (1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：
曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及種草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。
- (2) 剛開始使用的前幾個月可能發生出血或點狀出血，通常這些現象都是短暫的，如果出血或點狀出血持續，或治療後期才開始出現，或治療停止後不久出現，請向醫師求診。
- (3) 有使用抗高血壓藥治療之患者、癲癇、偏頭痛、糖尿病、氣喘或心臟衰竭的患者，應定期監測用藥狀況。
- (4) 以下患者不建議使用女性荷爾蒙替代療法，或請務必事先告知醫師評估風險：
 - ✓ 已知或懷疑曾患乳癌之患者
 - ✓ 已知或懷疑患有動情激素依賴型腫瘤者，如子宮內膜癌
 - ✓ 不明原因陰道出血者
 - ✓ 過去兩年內患有靜脈血栓者，例如深部靜脈血栓或肺栓塞
 - ✓ 有復發性靜脈血栓病史或有血栓疾病而尚未接受抗凝藥物治療者
 - ✓ 急慢性肝病或曾患肝病，且其肝功能未恢復正常者
- (5) 使用這種藥物時抽煙會增加心臟和血液相關不良反應的可能性，若您的年齡超過 35 歲且吸菸，建議勿服用此種藥物。
- (6) 忘記服藥時，若馬上想起請立即服用。如果已經接近下次服藥的時間，則不要再補服（記得不要一次補服兩倍的藥量）；如果漏服 2 天以上的劑量，請告知醫師。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138