

用藥指導單張 黃 5

TZD 類藥品

中文品名	英文品名	成分名	含量
欣促胰錠	Glutazone	Pioglitazone	30 毫克
雙革醣錠[複方]	Lodigit	Pioglitazone/Metformin	15 毫克/ 850 毫克

1. 適應症：治療第二型糖尿病（非胰島素依賴型糖尿病）
2. 服用方式：口服，可於飯前或飯後服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：類似感冒的症狀、頭痛、鼻竇疼痛、喉嚨痛、肌肉疼痛、低血糖。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	水腫或體重驟增、喘不過氣或呼吸困難。
3	尿液中有血或帶紅色、頻尿。
4	尿液成茶褐色、皮膚或眼球呈變黃、疲倦、沒有食慾。
5	骨骼疼痛、視力模糊。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 中度或重度心臟衰竭患者請告知醫師評估，可能不建議服用此類藥品。

(3) 服藥期間應遵醫囑控制飲食、規律運動，並定時自我監測血糖以及定期回診抽血檢驗。

請續閱背面

- (4) 此藥品可能會增加受孕機率，若未計畫懷孕，用藥期間應配合適當避孕措施。
- (5) 使用此藥品期間建議加強骨骼保健，特別是女性，建議可與醫師討論骨骼相關保健。
- (6) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138