

用藥指導單張 黃 2

雙胍類藥品(Metformin)

中文品名	英文品名	成分名	含量
立克醣膜衣錠	Glucomine	Metformin	500 毫克
優糖平錠	Eutomin		850 毫克
諾消醣錠	Anxoken		1000 毫克
美爾胰錠 [複方]	Amaryl M	Metformin/Glimepiride	500 毫克/2 毫克
醣安安錠 [複方]	Safemat		
高糖優美錠[複方]	Galvus Met	Metformin/Vildagliptin	500 毫克/50 毫克
克醣美錠 [複方]	GlucoMet	Metformin/Glibenclamide	500 毫克/5 毫克
雙革醣錠 [複方]	Lodigit	Metformin/Pioglitazone	850 毫克/15 毫克

1. 適應症：第二型糖尿病。
2. 服用方式：請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：腹瀉、噁心、嘔吐、胃脹氣、消化不良、頭痛、頭暈、體重增加、上呼吸道感染、關節或肌肉疼痛。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	嚴重低血糖：頭暈、頭痛、虛弱、心跳加快、意識模糊、昏厥。
3	茶褐色尿液、皮膚或眼球呈變黃、疲倦、沒有食慾。
4	持續性的虛弱、疲倦。
5	持續性的呼吸困難、水腫、關節或肌肉疼痛、不明的瘀青或出血。
6	意識混亂、癲癇發作。

請續閱背面

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 請定期自我監測血糖，以便醫師評估您的病情。

(3) 此類藥品初期使用可能會有輕微的腸胃不適，可於用餐時或餐後立即服用以減少不適感。

(4) [美爾胰錠]、[醣安安錠]、[克醣美錠]對於患有 G6PD 缺乏(蠶豆症)之病人具有高度風險會導致溶血反應，請主動告知醫師評估。

☹ 溶血反應症狀：臉色蒼白、全身黃疸、精神不佳、食慾差及解深茶色尿、呼吸窘迫、心臟衰竭、休克及意識昏迷。

(5) 曾對磺胺類藥品過敏者請主動告知醫師評估。

(6) 若需注射含碘顯影劑進行檢查，請主動告知醫師有服用此類藥品，以評估注射前是否需要停藥或注射後是否需要停藥 48 小時。

(7) 對於停經前婦女使用含有 Metformin、Pioglitazone 成分的藥品，可能會導致恢復排卵增加懷孕的可能性，視情況採取適當避孕措施。

(8) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138