

用藥指導單張 紅 16

中文品名：脈律循膠囊	英文品名：Meletin
成分名：Mexiletine	含量：100 mg

1. 適應症：心室性不整律。
2. 服用方式：口服。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：頭暈、嘔吐、頭痛、疲倦。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	肝臟異常警訊，例如尿黑，異常疲倦，糞便顏色淺，嘔吐或皮膚或眼睛發黃。
3	嚴重頭暈甚至暈倒。
4	呼吸急促，體重增加過多或手臂、腿部腫脹。
5	視覺改變。
6	新發生的或更糟的心跳異常、胸部疼痛。
7	任何無法解釋的瘀傷或出血。
8	癲癇發作。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138