

用藥指導單張 紅 15

| | |
|-----------------|----------------|
| 中文品名：心律正錠 | 英文品名：Rytmonorm |
| 成分名：Propafenone | 含量：150mg |

1. 適應症：心律不整(心室性心搏過速，上心室性心搏過速，W-P-W 症候群)。
2. 服用方式：請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：頭暈、頭痛、胸痛、心悸、疲勞、水腫、味覺障礙、噁心、便秘、嘔吐、呼吸困難、上呼吸道感染、焦慮。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

| | |
|---|---|
| 1 | 過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍； (痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒 |
| 2 | 胸痛或感到壓迫、心跳太快或太慢 |
| 3 | 嚴重頭暈或昏厥 |
| 4 | 出現心跳異常或是症狀加劇 |
| 5 | 呼吸急促、體重增加過多、手臂或腿部腫脹 |
| 6 | 視力模糊 |
| 7 | 感染跡象:發燒、發冷寒顫、喉嚨痛。 |

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 重症肌無力之患者要注意服藥期間症狀是否有惡化。

(3) 若出現心跳異常或是症狀加劇，可能會危及生命或導致猝死，應盡速回診就醫。

(4) 服藥期間避免食用柚類的水果或果汁，可能會造成藥效過強。

請續閱背面

- (5) 若發生流汗過多、體液流失、嘔吐、腹瀉、食慾不佳或口渴等症狀，請主動告知醫師。
- (6) 此藥可能會降低男性的精子數量，若有生育之計畫請主動告知醫師。
- (7) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138