

用藥指導單張 紅 14

中文品名：喜革脈錠	英文品名：Sigmart
成分名：Nicorandil	含量：5 毫克

1. 適應症：狹心症。
2. 服用方式：請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：頭痛、眩暈、口腔炎、噁心、嘔吐、食慾不振、心悸、顏面潮紅、疲倦。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	肝功能障礙、黃疸症狀：全身倦怠、食慾降低、噁心嘔吐、糞便顏色淺、皮膚或眼睛發黃、茶色尿液。
3	口內潰瘍、舌潰瘍、肛門或消化道潰瘍：黑便、血便。
4	不明原因出血：牙齦出血、眼睛出血、血尿、流鼻血、月經過多、皮膚出現瘀青或紅點。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 服用初期因為血管擴張作用，有可能導致搏動性的頭痛，此時應盡快回診依醫師的指示減少劑量或停止使用。

(3) 服藥期間不建議與 Viagra[®] 威而鋼、Levitra[®] 樂威壯、Cialis[®] 犀利士及 Adempas[®] 愛定保併用，可能會使血壓過度下降，請注意低血壓症狀並定期測量血壓。

請續閱背面

- (4) 患有 G6PD 缺乏(蠶豆症)之病人使用本品可能會發生高鐵血紅蛋白血症(呼吸困難、頭痛、頭暈、疲倦、神智不清、嗜睡、發紺症狀包括皮膚、指甲呈現藍紫色)，應在醫療人員監督下謹慎使用。
- (5) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138