

用藥指導單張 紅 11

中文品名：待匹力達	英文品名：Dipyridamole
成分名：Dipyridamole	含量：25 mg

1. 適應症：對於慢性狹心症之治療可能有效。
2. 服用方式：請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：心絞痛、潮紅、頭暈、頭痛、腹部不適、腹瀉、嘔吐。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍； (痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫； (燒)：發燒
2	嚴重頭暈或昏倒、胸痛發作或加劇。
3	肝功能異常：深色尿、感到疲倦、食慾降低、嘔吐、胃痛或胃部不適、 糞便顏色淺、皮膚或眼睛變黃。

4. 注意事項：

- (1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。
- (2) 重症肌無力患者服用該藥會導致重症肌無力惡化，使用前請諮詢醫師。
- (3) 服用此藥於姿勢變換時如起床或蹲下起立應小心緩慢進行。
- (4) 心臟衰竭、心絞痛或低血壓之患者服用此藥請留意自身症狀。
- (5) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138