

## 用藥指導單張 紅 10

中文品名：伯基腸溶微粒膠囊	英文品名：Bokey
成分名：Acetylsalicylic acid	含量：100 mg

1. 適應症：預防心肌梗塞，預防血栓性栓塞症，短暫性缺血性發作
2. 服用方式：口服。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。  
此藥為腸溶微粒，若為管灌病人需要服用，請打開膠囊將藥品微粒於開水中攪拌均勻後管灌即可，禁止將藥品微粒磨粉。
3. 可能發生的副作用：胃腸不適、噁心、嘔吐、胃黏膜受損、潰瘍。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	異常出血：咳血、尿液或糞便中有血、莫名瘀青、流血不止
3	無法排尿或體重大幅增加
4	皮膚或眼睛發黃，糞便顏色變淺，非常疲倦，食慾不振等。
5	持續性的心跳異常。
6	身體單側無力，說話困難，平衡失調，臉部單側下垂或視力模糊。

#### 4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 服用此藥可能使凝血時間變長，避免外傷造成出血，建議使用軟毛牙刷、電動刮鬍刀。

(3) 安排任何手術前請主動告知醫師正在服用此藥。

(4) 不宜使用於 12 歲以下兒童，亦不宜使用於 18 歲以下兒童及青少年之水

請續閱背面

痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病-雷氏症候群有相關性。

- (5) 患有 G6PD 缺乏(蠶豆症)之病人請主動告知醫師評估，服藥後應密切觀察自身反應，若發生以下溶血反應症狀：臉色蒼白、全身黃疸、精神不佳、食慾差及解深茶色尿、呼吸窘迫、心臟衰竭、休克及意識昏迷，請立即回診就醫。
- (6) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

#### 5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138