

# 用藥指導單張 紅 8

## 血管鈣離子通道阻斷劑

中文品名	英文品名	成分名	含量
<b>DHP 類</b>			
脈優錠	Norvasc	Amlodipine	5 毫克
壓可平錠	Amcopine		10 毫克
諾壓錠 [複方]	Amtrel	Amlodipine/Benazepril	5 毫克/10 毫克
康復來錠 [複方]	Coveram	Amlodipine/Perindopril	5 毫克/5 毫克
易安穩錠 [複方]	Exforge	Amlodipine/Valsartan	5 毫克/160 毫克
易德壓悅錠 [複方]	Exnortan	Amlodipine/Valsartan	5 毫克/160 毫克
			5 毫克/80 毫克
舒脈康錠 [複方]	Sevikar	Amlodipine/Olmesartan	5 毫克/20 毫克
紛落錠 [長效錠]	Felopine E.R	Felodipine	10 毫克
樂壓定錠	Lesyn	Lacidipine	4 毫克
利壓錠	Zanidip	Lercanidipine	10 毫克
壓達能 [軟膠囊]	Atanaal	Nifedipine	5 毫克
恆脈循錠 [長效錠]	Nifedipine SR		30 毫克
<b>非 DHP 類</b>			
心舒糖衣錠	Cintsu	Verapamil	40 毫克
合必爽錠	Herbesser	Diltiazem	30 毫克
凱帝心徐放 [長效錠]	Cardizem	Diltiazem	90 毫克

- 適應症：高血壓、心絞痛、狹心症。
- 服用方式：請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。  
 [長效錠] 請整粒配水吞服，勿咀嚼、剝半或磨粉。  
 [軟膠囊] 請按照醫師指示服用，不建議作為長期治療高血壓用藥。
- 可能發生的副作用：頭痛、頭暈、臉部潮紅、周邊水腫、心悸、心痛、噁心、便秘、低血壓、嗜睡、疲倦、上呼吸道感染、鼻竇炎、咽喉炎、多尿、咳嗽。  
 ☹️ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

請續閱背面

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍； (痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	嚴重頭暈、暈厥、出現胸痛或胸痛症狀加劇、心律不整。
3	呼吸急促、體重增加過多、手臂或腿部腫脹。
4	肌肉僵硬、晃動或肌肉疼痛、抽筋。

⊗ 若服用下列藥物出現對應症狀時，請立即回診就醫：

[脈優、壓可平]：疲倦、食慾降低、嘔吐、糞便顏色淺、皮膚或眼睛發黃。
[壓達能、恆脈循]：嚴重腹痛或便秘、黑便或咖啡色嘔吐物。
[心舒糖衣錠]：出現心跳異常或症狀加劇、心跳緩慢。

#### 4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 為降低感到頭暈或暈眩的機會，如果您一直坐著或躺著，請緩慢起身並小心上下樓梯。

(3) 服藥期間避免食用柚類的水果或果汁，可能會造成藥效過強。

(4) 利壓錠(Zanidip) 含有乳糖，有乳糖不耐症、乳糖酶缺乏症和半乳糖吸收不良者避免使用。

(5) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

4. 藥品保存：藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138