

用藥指導單張 紅 7

甲型交感神經受體阻斷劑

中文品名	英文品名	成分名	含量
“非選擇性”受體阻斷劑			
列優治[長效錠]	Lafuzo XL	Alfuzosin	10 mg
漢薩心[長效錠]	Haxasin XL	Doxazosin	4 mg
脈降錠	Telowsin	Terazosin	2 mg
“選擇性” [作用在膀胱或攝護腺]受體阻斷劑			
暢利淨 D 持續釋放手溶錠 [長效錠]	Tamlosin D	Tamsulosin	0.2 mg
活路利淨 OCAS 持續藥效 膜衣錠[長效錠]	Harnalidge OCAS	Tamsulosin	0.4 mg
益利舒持續性藥效膜衣錠 [長效錠]	Tamokas PR	Tamsulosin	0.4 mg
優列扶膜衣錠	Urief	Silodosin	8 mg

- 適應症：高血壓、良性前列腺肥大、排尿障礙。
- 服用方式：請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
 [長效錠] 請整粒配水吞服，勿咀嚼、剝半或磨粉。
 [口溶錠] 亦可配水吞服或是置於水中崩散後服用。
- 可能發生的副作用：無力虛弱、頭暈、頭痛、嗜睡、噁心、腹瀉、心悸、水腫、鼻塞、鼻炎、姿勢性低血壓、射精異常或逆行性射精。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍； (痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	嚴重頭暈或昏倒、胸痛發作或加劇。

請續閱背面

3	呼吸急促、心跳不正常，手臂或腿腫脹。
4	勃起疼痛（陰莖硬）或勃起持續時間超過 4 小時。

⊗ 若服用下列藥物出現對應症狀時，請立即回診就醫：

[漢薩心]：呼吸急促。
[脈降錠]：視力改變、快速的心跳、心跳不正常。
[暢利淨 D、活路利淨 OCAS 、益利舒]：發燒，發冷或嗓子疼。

4. 注意事項：

- (1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。
- (2) 對磺胺類藥品過敏者服用含有 Tamsulosin 成分的藥品可能會導致過敏，有該類過敏史者請主動告知醫(藥)師。
- (3) 服用“非選擇性”受體阻斷劑發生姿態性低血壓副作用的機率較高，為降低感到頭暈或暈眩的機會，姿勢變換時如起床或蹲下起立，請緩慢移動並小心上下樓梯。
- (4) 若有要進行白內障或其他眼科手術者，務必“事先”告知眼科醫師有在服用本類藥品。
- (5) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138