

用藥指導單張 紅 5

乙型交感神經受體阻斷劑

中文品名	英文品名	成分名	含量
非選擇性乙型(β)受體阻斷劑			
美特朗	Mikelan	Carteolol	5mg
恩特來	Inderal	Propranolol	10mg
選擇性乙型(β_1)受體阻斷劑			
康肯	Concor	Bisoprolol	5mg
			1.25mg
心肯	Cidincor		1.25mg
優心	Urosin	Atenolol	100mg
舒壓寧	Betaloc ZOK	Metoprolol	100mg
甲型、乙型(α 、 β)受體阻斷劑			
卡菲蒂羅	Carvedilol	Carvedilol	6.25mg
心全	Syntrend		25mg
湍泰低	Trandate	Labetalol	200mg

- 適應症：高血壓、心衰竭、狹心症、心絞痛、心律不整。
- 服用方式：口服；請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
- 可能發生的副作用：頭暈、頭痛、虛弱、疲倦、憂鬱、性功能障礙、腹瀉、胃部不適、嘔吐、鼻炎、心跳過慢、低血壓。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	胸痛發作或加劇、不正常心跳、心跳緩慢
3	嚴重頭暈或暈倒
4	呼吸急促、體重增加過多、手臂或腿部腫脹
5	四肢冰冷、不正常灼熱感及麻木或刺痛感

請續閱背面

⊗ 若服用下列藥物出現對應症狀時，請立即回診就醫：

[恩特來]：幻覺、健忘、類紅斑性狼瘡徵狀（臉頰、身體出現皮疹、容易曬傷、肌肉或關節痛、胸痛、呼吸急促、手臂或腿部腫脹）

[湍泰低]：肝功能異常（疲倦、食慾降低、嘔吐、糞便顏色淺、皮膚或眼睛發黃）

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 為降低感到頭暈或暈眩的機會，如果您一直坐著或躺著，請緩慢起身並小心上下樓梯。

(3) 此類藥品可能會遮蔽低血糖症狀（如：頭暈、頭痛、嗜睡、虛弱，發抖，心跳加快，意識混亂，飢餓或冒冷汗），糖尿病患者要密切監測血糖變化。

(4) 請勿突然自行停藥有可能會導致出現胸痛，應按照醫生指示逐漸減量停藥，若出現胸痛或胸痛加劇或其他心臟問題，應立即回診。

(5) 氣喘或慢性阻塞性肺病患者請主動告知醫師，非選擇性的受體阻斷劑可能會惡化症狀。

(6) 如果要進行白內障手術或其他眼科手術，請主動告知醫師。

(7) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138