

用藥指導單張 紅 4

血管收縮素轉化酶抑制劑(ACEI)

中文品名	英文品名	成分名	含量
雅施達錠	Acertil	Perindopril	4 毫克
康復來	Coveram	[兩種成分] Perindopril /Amlodipine	5 毫克/ 5 毫克
脈利舒複方錠劑	Moreez complex	[兩種成分] Perindopril /Indapamide	5 毫克/ 1.25 毫克
諾壓錠	Amtrel	[兩種成分] Benazepril /Amlodipine	10 毫克/ 5 毫克
卡布登錠	Cabudan	Captopril	25 毫克

1. 適應症：高血壓、心衰竭
2. 服用方式：口服。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：乾咳、眩暈、頭痛、水腫。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	肝臟異常警訊，例如尿黑，異常疲倦，糞便顏色淺，嘔吐或皮膚或眼睛發黃。
3	腎臟異常警訊，例如無法排尿，尿量改變，血尿或體重增加過多。
4	血鉀過高的跡象，如心跳不正常、呼吸急促。
5	持續咳嗽。
6	嚴重頭暈，甚至暈倒。
7	嚴重腹痛。

請續閱背面

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 不確定藥品是否會影響注意力之前，避免駕駛和執行其他要求保持警惕的工作。

(3) 為降低感到頭暈或暈眩的機會，久坐或久躺後，請緩慢起身，並小心上下樓梯。

(4) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138