

# 用藥指導單張 紅 1

|   |                    |
|---|--------------------|
| 中文品名：律壓平複方糖衣錠                                 | 英文品名：Reserzide     |
| 成分名：Reserpine/Hydralazine/Hydrochlorothiazide | 含量：0.1mg/10mg/10mg |

1. 適應症：高血壓
2. 服用方式：口服，可飯前或飯後服用，為了避免夜間起床小便，則避免安排晚上六點後吃藥。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：便秘、腹瀉、胃痙攣、食慾喪失、胃部不適或嘔吐、疲倦、虛弱、頭暈、頭痛、口乾、肌肉疼痛、鼻塞、焦慮、體重增加、流鼻血。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

|     |   |
|-----|---|
| 1   | 過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒 |
| 2   | 高血糖跡象，如意識混亂，口渴，頻尿，潮紅，呼吸加快。  |
| 3   | 出現體液和電解質問題，例如情緒變化，精神錯亂，肌肉疼痛或無力，心跳不正常，昏倒，癲癇發作，嚴重嘔吐                     |
| 4   | 非常嚴重的胃痛，背痛或嘔吐。  |
| 5   | 無法小便，小便變黑或排尿時疼痛。  |
| 6   | 皮膚或眼睛發黃   |
| 7   | 發燒或發冷、不正常的灼熱，麻木或刺痛感。  |
| 8.  | 該藥物可能引起某些眼部疾病，通常發生在開始使用藥物的幾小時到幾週內，產生視力變化或眼痛。                          |
| 9.  | 皮疹，容易曬傷，肌肉或關節痛，胸痛或手臂或腿腫脹。   |
| 10. | 快速或異常心跳。  |

## 4. 注意事項：

- (1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：  
曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。
- (2) 此藥可能會降低對性的興趣或無法勃起，若此現象造成困擾請回診時跟

請續閱背面

醫師討論。

- (3) 對磺胺類藥品過敏者請主動告知請主動告知醫(藥)師。
- (4) 久坐後起立或下床時放慢速度，降低頭暈的機率。
- (5) 此藥可能會有影響注意力之副作用，若有發生請勿操作機械或駕車。
- (6) 該藥物可能會引起情緒低落（抑鬱），停藥後可能會持續幾個月，嚴重的話足以引發自殺的念頭，若有這類現象請提早告知醫師。
- (7) 痛風患者請注意服用此藥後是否有明顯增加痛風發作的機率。
- (8) 紅斑性狼瘡病人請先告知醫師，此藥可能會使其惡化。
- (9) 此藥可能使您更容易曬傷，注意防曬。
- (10) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

#### 5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138