

## 用藥指導單張 綠 13

中文品名：卡馬平錠	英文品名：Camapine
成分名：Carbamazepine	含量：200 毫克

1. 適應症：癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症及雙極性疾患
2. 服用方式：口服；可在用餐時，用餐後或兩餐之間使用，應和一些水一起服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。

### 3. 可能發生的副作用：

頭暈、瞌睡、噁心、嘔吐、疲倦、口乾、便秘、腸胃不適。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	低血鈉症狀：頭痛、平衡感改變、注意力不集中、記憶混亂、意識不清、虛弱、癲癇
3	抗精神病藥物惡性症候群：發燒、肌肉痙攣/僵硬、嚴重頭痛、意識混亂、出汗、心悸
4	肝腎功能異常症狀：排尿困難、排尿量改變、茶褐色尿液、沒有食慾、皮膚或眼球呈變黃、疲倦
5	貧血症狀：疲倦、虛弱、發燒、寒顫、呼吸短促、不明之瘀青或出血
6	其他：產生幻覺、語言障礙、視力模糊、行動不便

### 4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 開始服藥後，如果癲癇發作之症狀有變化或頻率增加，請告知醫師。

請續閱背面

- (3) 請勿任意自行停藥，以避免增加癲癇發作風險；若需用藥調整，請先和您的醫師進行討論。
- (4) 服藥期間可能會引起暈眩或嗜睡，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。
- (5) 本藥品具有輕微抗膽鹼作用，因此服用本藥品的病人眼內壓可能會升高。
- (6) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138