

用藥指導單張 綠 18

中文品名：優閒膜衣錠	英文品名：Keppra
成分名：Levetiracetam	含量：500 毫克

1. 適應症：


十六歲以上病患之局部癲癇發作之單獨治療。四歲以上孩童或成人病患之局部癲癇發作，十二歲以上青少年與成人病患之肌抽躍性癲癇發作，以及十六歲以上青少年與成人患有體質性泛發性癲癇的原發性泛發性強直陣攣發作之輔助治療。







2. 服用方式：

以足量水伴服吞入，飯前或飯後均可。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。

3. 可能發生的副作用：

嗜睡、頭痛、疲勞、暈眩、失眠、腹痛、腹瀉、嘔吐、食慾降低、類似感冒的症狀。

 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：  ：皮膚紅疹、搔癢或水泡；  ：口腔或黏膜潰瘍；  ：喉嚨痛；  ：眼睛紅腫、灼熱；  ：眼睛、嘴唇腫；  ：發燒
2	出現幻覺、平衡失調、嚴重眩暈或暈倒、步伐不穩
3	具攻擊性、抑鬱、焦慮、易怒、恐慌、自殺意念、行為異常
4	感染現象(發燒、寒顫)、不明原因之瘀青或出血

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

請續閱背面

- (2) 服藥期間可能會引起暈眩或嗜睡, 在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。
- (3) 開始服藥後, 如果癲癇發作之症狀有變化或頻率增加, 請告知醫師。
- (4) 請勿任意自行停藥, 以避免增加癲癇發作風險; 若需用藥調整, 請先和您的醫師進行討論。
- (5) 口服給藥後, 可能會出現 Levetiracetam 的苦味。
- (6) 若忘記服藥, 應於想起時立即服用; 若已接近或已到下一次的服藥時間, 只需服用下一次藥量, 絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊, 如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138