

# 用藥指導單張 藍 2

## 支氣管擴張劑-茶鹼類藥品

中文品名	英文品名	成分名	含量
胺非林錠	Aminophylline	Aminophylline	100 毫克
鐵寧喘持續性錠	Telin SR	Theophylline	200 毫克
喘悅長效錠持續型	Antiasth SR	Aminophylline	225 毫克

1. 適應症：氣喘及支氣管痙攣。
2. 服用方式：口服，請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。  
[鐵寧喘]、[喘悅] 為長效持續錠，請勿磨粉服用。  
[鐵寧喘] 不建議剝半服用。[喘悅] 可剝半服用。
3. 可能發生的副作用：心悸、顫抖、抽蓄、頭痛、失眠、胃食道逆流、噁心、嘔吐、頻尿。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒。
2	低血鉀徵象，如：持續性的肌肉疼痛或無力，肌肉痙攣或心跳不正常。
3	高血糖徵象，如：意識混亂、嗜睡、呼吸急促、嗅覺出現水果味。

#### 4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 服藥期間應避免食用含咖啡因的產品(例如茶、咖啡、可樂、巧克力和酒精)或抽菸，可能會增強心跳加快或神經緊張的副作用。

請續閱背面

- (3) 服藥期間可能會影響血糖變化，糖尿病病人服用此藥應定期監測血糖。
- (4) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138