

用藥指導單張 藍 3

乙二型擬交感神經劑($\beta 2$ -agonists)

中文品名	英文品名	成分名	含量
喘平樂	Baburol	Bambuterol	10 毫克
服莫喘	Formorol	Formoterol	40 微克
滅喘淨微	Meptin-mini	Procaterol	25 微克
喘解液[水劑]	Exdila	Procaterol	5 微克/毫升
利多喘	Saltolin	Salbutamol	2 毫克
泛得林	Ventolin		

1. 適應症：支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。
2. 服用方式：口服，請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：頭痛、水腫、暈眩、心悸、失眠、皮膚反應、高血糖、腸胃不適、肌肉僵直或顫抖、上呼吸道症狀等。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒。
2	低血鉀徵象，如：持續性的肌肉疼痛或無力，肌肉痙攣或心跳不正常。
3	高血糖徵象，如：意識混亂、嗜睡、呼吸急促、嗅覺出現水果味。
4	高血壓徵象，如：嚴重頭痛、暈眩、暈厥或視力模糊。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

請續閱背面

(2) 此藥品可能會影響血壓或血糖，高血壓或糖尿病患者服藥期間請定期測量血壓或血糖，注意數值變化。

(3) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138