

用藥指導單張 藍 4

氫離子幫浦抑制劑(PPI)

中文品名	英文品名	成分名	含量
耐適恩錠	Nexium	Esomeprazole	40 毫克
悠胃樂 腸溶微粒膠囊	Omeprotect	Omeprazole	20 毫克
盼胃好 腸溶膜衣錠	Panho	Pantoprazole	40 毫克
百抑潰 腸溶膜衣錠	Pariet	Rabeprazole	20 毫克
泰克胃通 口溶錠	Takepron	Lansoprazole	30 毫克

1. 適應症：胃食道逆流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌相關的消化性潰瘍。
2. 服用方式：口服。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
請勿磨粉，若無法吞嚥有三項藥品可用下列方式服用：
[悠胃樂] 打開膠囊將藥粉混於水中攪拌均勻立即服用。
[耐適恩]、[泰克胃通] 將藥錠泡水後崩散攪拌均勻立即服用。
3. 可能發生的副作用：腹痛、便秘、腹瀉、脹氣、噁心、嘔吐、頭痛等。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	嚴重腹瀉：腹部抽痛、水瀉、血便，可能和腸道困難梭狀桿菌感染有關。
3	低血鎂：情緒變化、肌肉疼痛或無力、肌肉痙攣或痙攣、抽蓄、顫抖、劇烈的胃不適或嘔吐、心律不整。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、

請續閱背面

懷孕或計畫懷孕或哺乳。

- (2) 長期服用此類藥品(尤其是超過一年)可能會影響鈣質的吸收，增加骨質疏鬆的風險，建議補充鈣片和維他命 D3，或與您的醫師討論骨質的保健方式。
- (3) 長期服用此類藥品(尤其是超過三年)，有少數會有維他命 B12 降低的情況，可適量補充維他命 B 群或 B12。
- (4) 服用此藥可能會加劇原本紅斑性狼瘡的症狀或極少數人會誘發紅斑性狼瘡的症狀，若有臉頰或其他部位出現不明紅斑、肌肉關節疼痛、胸痛、呼吸急促、四肢腫脹的情形，請就醫或回診時告知醫師。
- (5) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138