

用藥指導單張 藍 5

H2 受體阻斷劑(H₂-blockers)

中文品名	英文品名	成分名	含量
可胃明錠	Cowemin	Cimetidine	300 毫克
法瑪鎮膜衣錠	Famotidine	Famotidine	20 毫克

1. 適應症：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群。
2. 服用方式：口服。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：躁動、便秘、腹瀉、暈眩、頭痛等。

[可胃明] 長期服用(四個月以上)可能會發生男性女乳症。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒。

☹ 若服用下列藥物出現對應症狀時，請立即回診就醫：

[可胃明]: 肝功能異常症狀，如深色尿、異常疲倦、食慾不振、嘔吐或皮膚或眼睛發黃。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138