

用藥指導單張 藍 6

中文品名：補斯可伴糖衣錠	英文品名：Buscopan
成分名：Hyoscine-N-butylbromide	含量：10 毫克

1. 適應症：胃腸痙攣及運動亢進、膽管痙攣及其運動障礙、尿路痙攣、女性生殖器之痙攣症狀。
2. 服用方式：口服，可於飯前或飯後服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：產生睡意、暈眩、口乾、躁動、視力模糊、散瞳、心跳過快、腸胃蠕動變慢、排尿困難、尿滯留。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒。
2	無法排尿。
3	視力模糊、眼睛疼痛。
4	無法說話。
5	神智改變、出現幻覺。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 此藥品會影響注意力，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作機械。

(3) 為降低感到頭暈或暈眩的機會，如果維持坐著或躺著一段時間後，請慢慢改變姿勢，上下樓梯也須小心。

(4) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138