

用藥指導單張 紫 7

促性腺激素類似劑藥品 GnRH analogue

中文品名	英文品名	成分名	含量
柳菩林一個月注射劑	Leuplin 3.75	Leuprolide	3.75 毫克
柳菩林三個月注射劑	Leuplin 11.25		11.25 毫克
癌立佳一個月注射劑	Eligard 7.5		7.5 毫克
癌立佳三個月注射劑	Eligard 22.5		22.5 毫克
諾雷德注射劑	Zoladex	Goserelin	3.6 毫克

1. 適應症：前列腺癌、子宮內膜異位、停經前乳癌。

(癌立佳 Eligard 只適用於前列腺癌)

2. 服用方式：皮下注射，注射的劑量會因不同的疾病而異，請遵照醫師指示按時回診注射藥品，否則會造成病情惡化。

3. 可能發生的副作用：首次使用初期會有暫時性腦下垂體-性腺系刺激作用，可能會出現暫時性的症狀惡化或是短暫性的骨骼疼痛現象；之後就會產生性荷爾蒙的抑制作用。

以下為常見的副作用：類似更年期的抑鬱狀態、熱潮紅、失眠、發汗、關節痛、皮疹、搔癢、周邊水腫、感覺異常、體重增加、貧血。

女性特有的副作用：骨密度降低、子宮出血、陰道乾燥、乳房疼痛。

男性特有的副作用：陽萎、男性女乳症；罹患糖尿病、心血管疾病的風險可能會增高，應定期監測血糖和血壓的狀況；可能會降低血糖耐受度，糖尿病患者應密切注意血糖變化。

請續閱背面

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	皮膚紅腫疼痛或起水泡
2	有任何部位產生紅腫熱痛的感染症狀

4. 注意事項：

- (1) 懷孕與哺乳婦女禁止經手接觸和使用。
- (2) 停經前婦女注射本藥時，月經會受到抑制，某些女性在停止治療後無法恢復月經。
- (3) 注射本藥期間避免受孕，請使用非藥物性的避孕措施。
- (4) 有在服用心血管用藥或是抗凝血藥物的患者請先主動告知醫(藥)師，確保無藥物交互作用之影響。
- (5) 可能會導致骨密度的降低，請和醫(藥)師諮詢預防骨質流失的方式。

5. 藥品保存：

請勿攜帶回家，領藥後請立即至注射室施打。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138