

用藥指導單張 紫 12

5 α 還原酶抑制劑

中文品名	英文品名	成分名	含量
適尿通	Avodart	Dutasteride	0.5 毫克
法路寧	Finaride	Finasteride	5 毫克

1. 適應症：攝護腺肥大症。
2. 服用方式：口服，可於飯前或飯後服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。

[適尿通]：軟膠囊，需整顆吞服，不可咬碎或將膠囊打開。

3. 可能發生的副作用：輕度的勃起不能、性慾降低、射精障礙、乳房觸痛、乳房腫大、頭暈等。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

過敏反應 (疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；
(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 服藥期間若有發現乳房部位異常的症狀，如摸得到硬塊、疼痛、腫大、乳頭分泌物等情形，請提早安排回診就醫。

(3) 服藥期間若有發現持續明顯的情緒低落或憂鬱情形，請提早安排回診就醫。

請續閱背面

- (4) 為了避免懷孕婦女接受輸血而吸收到此類藥品，最後一次服用[適尿通]後六個月內或最後一次服用[法路寧]後一個月內，不應捐血。
- (5) 懷孕、育齡婦女及小孩應避免接觸到裂損的藥品，藥品成分可能經由皮膚吸收後對男性胎兒造成危險。若不慎接觸，應立即以肥皂和水清洗該區域。
- (6) 此藥品可能會影響注意力，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作機械。
- (7) 為減少頭暈或昏倒的風險，若您長時間坐立或躺下，請慢慢起身，上下樓梯也應多加注意。
- (8) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138