

用藥指導單張 紫 21

中文品名：蕾莎瓦膜衣錠	英文品名：Nexavar
成分名：Sorafenib	含量：200 毫克

- 適應症：有條件下的晚期肝細胞癌(HCC)、晚期腎細胞癌(RCC)、進行性分化型甲狀腺癌(DTC)。
- 服用方式：請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
配開水整顆吞服，須與食物間隔服用，至少要用餐前一小時或餐後二小時。
對於無法吞服藥錠之病人，可將藥錠泡在半杯水中，待藥錠崩散後，攪拌均勻立即服用，服用完畢後將容器清洗乾淨。
- 可能發生的副作用：由於此藥品屬於抗癌標靶藥品，發生副作用的機率較高，請密切注意自身症狀，若有任何持續且無法忍受的副作用請回診就醫。
高血壓、禿頭、皮膚反應(紅斑、紅疹、乾癢、手足症候群)、低白蛋白血症、低血鈣、低血磷、體重減輕、腹痛、便秘、食慾不振、噁心、嘔吐、口腔潰瘍、骨髓毒性(貧血、血小板或白血球過低)、凝血異常、感染、疲累、頭痛、感覺異常、聲音改變、四肢疼痛、上呼吸道症狀等。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：⊗：皮膚紅疹、搔癢或水泡；⊗：口腔或黏膜潰瘍； ⊗：喉嚨痛；⊗：眼睛紅腫、灼熱；⊗：眼睛、嘴唇腫；⊗：發燒
2	異常出血：咳血、尿液或糞便中有血、莫名瘀青、流血不止。
3	電解質異常症狀：肌肉無力、疼痛、癲癇、心跳異常、精神錯亂。
4	腎臟異常症狀，如無法排尿，尿量改變，血尿或體重增加過多。
5	高血壓症狀：劇烈頭痛、暈眩、視力模糊、昏厥。
6	嚴重皮膚不良反應：皮疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮、迅速擴散的腫脹等情形。

請續閱背面

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 服藥期間免疫力降低，養成洗手和配戴口罩的好習慣，避免生食。

(3) 在不確定藥品是否會影響注意力之前，避免駕駛或其他需要集中注意力的工作。

(4) 接種任何疫苗之前，請先告知醫生有在使用此藥。服藥期間若接種某些疫苗可能會增加感染風險或導致疫苗無法發揮作用。

(5) 服藥期間注意是否有異常出血狀況，避免受傷，使用軟毛牙刷、電動刮鬍刀。

(6) 服用此藥品可能會有心缺血或心肌梗塞的風險，若有曾發生胸痛或呼吸困難的狀況，回診時請告知醫師，若症狀持續且未停止，請盡快就醫。

(7) 服藥期間可能會發生高血壓，尤其是在前六周治療期，服藥期間應定期測量血壓和心律，有心律不整病史請主動告知醫師。

(8) 有在服用心血管用藥或是抗凝血藥物的患者請先主動告知醫師或藥師，確保無藥物交互作用之影響。

(9) 若忘記服藥，直接於下一次的服藥時間，服用一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138