

## 用藥指導單張 紫 22

中文品名：舒癌特膠囊	英文品名：Sutent
成分名：Sunitinib	含量：12.5 毫克

- 適應症：腸胃道間質腫瘤(GIST)、晚期腎細胞癌(RCC)、胰臟神經內分泌腫瘤(pNET)、腎細胞癌輔助治療。
- 服用方式：口服，隨餐或空腹服用均可。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
- 可能發生的副作用：由於此藥品屬於抗癌標靶藥品，發生副作用的機率較高，請密切注意自身症狀，若有任何持續且無法忍受的副作用請回診就醫。  
胸痛、高血壓、禿頭、皮膚反應(紅斑、紅疹、搔癢、手足症候群、膚色變黃)、血液電解質異常、甲狀腺低下、血液尿酸值上升、腹痛、便秘、腹瀉、味覺障礙、腸胃脹滿、噁心、口腔炎、骨髓毒性(貧血、血小板或白血球過低)、肝指數上升、感染、虛弱、頭痛、暈眩、無力、四肢疼痛、上呼吸道症狀等。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2	異常出血：咳血、尿液或糞便中有血、莫名瘀青、流血不止
3	電解質異常症狀：肌肉無力、疼痛，癲癇、心跳異常、精神錯亂。
4	腎臟異常症狀，如無法排尿、尿量改變、血尿或體重增加過多。
5	肝臟異常症狀，如深色尿、異常疲倦、糞便顏色淺、持續嘔吐、皮膚或眼睛變黃。
6	劇烈不已的腹痛。
7	腫瘤溶解症候群：噁心、嘔吐、昏睡、水腫、體液過多、心衰竭、心跳加快或異常、抽筋、手足抽搐、暈倒等。

請續閱背面

8	嚴重皮膚不良反應(史蒂芬-強森症候群/毒性表皮溶解症)：皮疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮、迅速擴散的腫脹等情形請立刻回診。
9	感染症狀，如發燒、發冷、咽喉痛、耳朵或鼻竇疼痛、咳嗽、痰多或痰液顏色改變、口腔潰瘍或傷口無法癒合。

#### 4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 服藥期間免疫力降低，養成洗手和配戴口罩的好習慣，避免生食。

(3) 接種任何疫苗之前，請先告知醫生有在使用此藥。服藥期間若接種某些疫苗可能會增加感染風險或導致疫苗無法發揮作用。

(4) 服藥期間注意是否有異常出血狀況，避免受傷，使用軟毛牙刷、電動刮鬍刀。

(5) 服藥期間可能會發生高血壓，服藥期間應定期測量血壓和心律，有心律不整病史請主動告知醫師。

(6) 此藥可能會造成嚴重低血糖，正在使用降血糖藥品的糖尿病人需特別注意低血糖的相關徵兆，如有發生應立即處理。

(7) 有在服用心血管用藥或是抗凝血藥物的患者請先主動告知醫師或藥師，確保無藥物交互作用之影響。

(8) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

#### 5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138