

用藥指導單張 紫 14

中文品名：易克黴膠囊	英文品名：Icomein
成分名：Itraconazole	含量：100 毫克

1. 適應症：全身性或深部黴菌感染、甲癬、髮癬。
2. 服用方式：口服，應於飯後立即服用以達最佳吸收效果。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：噁心、嘔吐、腸胃不適、水腫、高血壓、頭痛、暈眩、皮疹、搔癢、高三酸甘油酯、低血鉀、肝功能異常、上呼吸道症狀等。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：⊗：皮膚紅疹、搔癢或水泡；⊗：口腔或黏膜潰瘍；⊗：喉嚨痛；⊗：眼睛紅腫、灼熱；⊗：眼睛、嘴唇腫；⊗：發燒。
2	肝功能異常警訊：深色尿、異常疲倦、無食慾、嘔吐、皮膚或眼睛發黃、右上腹部或右肩區域疼痛、發燒寒顫。
3	電解質異常症狀：肌肉無力、疼痛、癲癇、心跳異常、精神錯亂。
4	高血糖徵象：意識混亂、嗜睡、呼吸急促、嗅覺出現水果味。
5	聽力異常或喪失

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 此藥品可能會影響注意力，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。

(3) 此藥品和其他藥品的交互作用較為複雜，請諮詢藥師檢查目前正在服用的其他藥品是否會造成影響。

請續閱背面

- (4) 制酸劑和此藥品建議間隔至少二小時服用。
- (5) 此藥品不建議用於心衰竭或曾有心衰竭病史的病人，有心衰竭病史者請先告知醫師。
- (6) 服用此藥期間若有發現心衰竭症狀，如：呼吸急促、體重短時間內增加、心跳過快、很常半夜醒來、四肢腫脹，請提早安排回診就醫。
- (7) 曾有接受此藥品治療而造成短暫或永久聽力受損的報告，聽力受損通常在停止服藥後就會恢復，但部分病人會因此造成永久性的聽力受損。服藥期間請注意是否有聽力異常的現象。
- (8) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138