

用藥指導單張 藍 7

中文品名：腹寧朗膜衣錠	英文品名：Primperan
成分名：Metoclopramide	含量：5 毫克

1. 適應症：預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。
2. 服用方式：口服，可於飯前或飯後服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：嗜睡、運動障礙、倦怠、躁動等。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒。
2	罕見但情況危急的抗精神病藥物惡性症候群，症狀包括：高燒、肌肉痙攣或僵硬、頭暈、劇烈頭痛、精神錯亂、心跳加快或異常、出汗過多等。
3	罕見但情況危急的 <u>血清素症候群</u> ，症狀包括：精神錯亂、出現幻覺、高燒、心跳變快或異常、肌肉抽搐或僵硬、癲癇發作、嚴重出汗、腹瀉嘔吐、嚴重頭痛等。
4	遲發性運動障礙，症狀包括：無法控制身體的動作、抽搐、顫抖、無法平衡、吞嚥或說話困難、眨眼、扮鬼臉、眼球上吊等。
5	乳房增大，乳頭有滲出液，男性無法勃起或保持勃起或女性經期改變。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 除非是醫師處方，不建議長期服用此藥品(超過 12 週)。

(3) 中老年人服用此藥發生遲發性運動障礙的副作用機率較高，請注意是否

請續閱背面

有上述表格內提到的症狀，若有發生請立即回診就醫。

- (4) 若本身有在服用抗憂鬱或抗帕金森氏症的藥品，服用此藥發生血清素症候群的機率較高，請注意是否有上述表格內提到的症狀，若有發生請立即回診就醫。
- (5) 服用此藥期間可能會影響血糖變化，糖尿病患者請注意監測血糖。
- (6) 服藥期間避免飲酒，可能會使動作遲緩。
- (7) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138