

用藥指導單張 藍 8

中文品名：癩吐寧錠	英文品名：Emetrol
成分名：Domperidone	含量：10 毫克

1. 適應症：噁心、嘔吐的症狀治療、糖尿病引起的胃腸蠕動異常。
2. 服用方式：口服，建議飯前服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：頭痛、口乾、溢乳等。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒。
2	乳房增大，乳頭有滲出液，男性無法勃起或保持勃起或女性經期改變。
3	持續性的心跳過快或異常。

4. 注意事項：

- (1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：
曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。
- (2) 除非是醫師處方，否則不建議每日服用超過 3 顆，可能會增加心律不整副作用的風險。
- (3) 老年人服用此藥心律不整副作用的發生率會提高，請注意心跳變化。
- (4) 本身患有心律不整或正在服用心律相關的藥品服用此藥心律不整副作用的發生率會提高，請主動告知醫師評估。
- (5) 服藥期間避免食用葡萄柚及其相關食品。
- (6) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138