

用藥指導單張 藍 9

腸道解痙劑

中文品名	英文品名	成分名	含量
特良高朗	Trancolon	Mepenzolate	7.5 毫克
舒攣平	Spastec	Pinaverium	50 毫克
鎮痙	Spaspa	Alverine	60 毫克
腸必寧	Catilon	Otilonium	40 毫克

1. 適應症：十二指腸或胃潰瘍、膽管運動困難、腸躁症腹痛症狀之緩解。
2. 服用方式：口服。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：頭暈、視力模糊、便秘、口乾、尿滯留、排汗困難等。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應 (疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍； (痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒。
2	嚴重暈眩、無法入睡、語言障礙、情緒變化、平衡感異常、出現幻覺、 記憶力改變、意識混亂或失去意識。
3	無法排尿導致膀胱很脹。

4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、
懷孕或計畫懷孕或哺乳。

(2) 此類藥可能會影響注意力，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或
操作危險機械。

(3) 青光眼患者服藥期間請定期回眼科檢查，注意眼壓變化。

(4) 服藥期間若有發生急性的腸胃道疾病，建議可先停藥盡快就醫。

請續閱背面

- (5) 此類藥品可能會影響排汗功能，於高溫環境需注意中暑現象。
- (6) 老年人服用此類藥品副作用發生的機率較高，請注意自身服藥反應。
- (7) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138